

OCLUSIÓN VASCULAR RETINIANA

Claudio A. Almada

alejandro.almada@gmail.com

Hospital Oftalmológico Enrique Demaria
Santiago del Estero



HOSPITAL
OFTALMOLÓGICO
PROF. DR.
ENRIQUE B. DEMARIA



SANTIAGO
El Poder de la Medicina en Santiago del Estero

OBJETIVO

Describir un caso de pérdida súbita de la visión debido a obstrucción de arteria central de la retina.

CASO CLÍNICO

Paciente femenina / 55 / No App / AT: Tabaquismo

MC: "Se me puso todo oscuro"

Examen oftalmológico:

AV: OD 10/10 OI PL / PIO 15 AO

Segmento anterior: S/P

Fondo de ojo:

OI: Palidez retiniana / Alteración relación calibre arteria/vena



Se realiza el diagnóstico de obstrucción de arteria retiniana, iniciándose como conducta inicial posición decúbito supino y masajes oculares y antiagregación VO.
Se solicitó RFG e IC con servicio de Cardiología.



Posteriormente fue diagnosticada y tratada por HTA, siguiendo controles de rutina cardiológicos. Imágenes de vasos de cuello y cardíacas normales.

CONCLUSIÓN

El rápido diagnóstico y tratamiento en la obstrucción de vasos retinianos es esencial para la recuperación visual, teniendo presente que el 70% de los casos la visión residual es mínima.